山林經濟 三

Carpentrer

增補山林經濟卷之五目錄

增補山林經濟卷之五

養蠶

飢食寒衣關於人一也而非蠶何以爲衣故別錄養蠶之方必遵其法則用力少而得繭多矣

養蠶吉日○浴連出蠶安提入簇宜用戊辰壬午甲午乙巳甲寅丁巳戊午日更得收繭天德月德月合明星五富等日又養浴蠶宜甲子丁卯庚午壬午戊午又出蠶宜甲子庚午癸酉庚辰乙酉甲午乙巳甲申壬午乙未癸卯丙午丁未戊申甲寅戊午收成開日○出蠶交蝶浴種大忌日三月辰戌四月巳亥五月卯酉十二月子丑又庚戌蠶姑死日忌之○蠶室忌命官方此節蠶官所

在方亥子丑年方未寅卯辰年方戌巳午未年方丑申酉戌年方辰此方

春月動土蠶桑俱失○泥蠶室吉日二月初五日

祀蠶神○祀蠶神吉日五月初五日祀蠶神室當午處具香食餅

酒以茶代酒令蠶婦禱祀齊諸記吳縣張成夜見婦人於宅南婦人舉手招成曰此地君家蠶室我即其神明

年正月半宜作白粥泛膏於上以祀我已後年年大得蠶

備蠶具○凡蠶室坐屋為上西屋次之蠶喜東照故大忌東屋如無西窗亦可

為西日照暎又西風非長養之氣也○泥蠶室亦須擇日蠶生

一月之前預修蠶室要寬快潔淨通風氣暎日陽墻壁勿使有

濕屋前不宜有樹窗戶糊以新紙令虛明易辨眠起各備常簾

下附地列置風竇令可啓閉以除濕鬱蟻生三五日之前先將

蠶屋用火熏煖○臘月刈茇草收積勿令雨浥損來春作蠶蓐則作蔟加倍厚密今用椽栗枝或藁草○蠶喜牛糞牛喜蠶砂故牛糞熏屋大宜蠶至月多收牛糞堆聚至春暖踏墼坏於蠶房內燒之令無烟○乾桑葉臘月內搗磨成麵以篦多數收貯飼蠶則能消蠶熱餘剩者可做牛料甚美擇日安排上下間鋪三箔上承塵埃下隔濕潤鋪地磚稈草上中箔以備分擡

擇種○必謹審蔟之雌雄尖細緊小腰小者為雄圓慢穩厚腰大者雌也雌雄相兼而收俟開簇時擇延上向陽或在苫草上明潔堅實者置透風涼房內淨箔上一一單排日數既足其蛾自出第一日出者為苗蛾末後出者為本蛾皆不可用若有拳翅

秃眉焦尾焦脚赤肚無毛黑毛黑紋黑身黑頭者亦不用只留完全肥好者以厚紙為連散蛾於上以次日已後每一日出者為一連至十八日後西南淨地掘坑貯蛾以土封之庶免虫禽傷食下蛾時二日相次為一筆若次三日則為將来眠起成繭皆不齊其生子如環成堆者亦不用生子數足更令連上覆養三五日後（一云十八日）遇天色晴明日未出時汲井甜水浴連約一飯浸去毒氣掛於風涼房内（一云連筆相靠鈎掛又曰掛勿令時蠶子向外恐有風霏其子）烟熏日炙至十月捲收頓放於無烟淨屋内（蚕最忌麻学切勿近蚕種蚕必不生又忌麝香）○冬至日浴連臘之十二浸之於盐水至二十四出則利於繰絲或曰臘之八日以桑柴灰或稲草灰淋汁浸連一日而

出繼以雪水浸懸乾桑木之上冒雨雪三宿而收之則耐養又曰浴蠶流水爲上井華水次之無令水極冷浴畢用桑皮繩懸掛於庭中高竿以受日精月華最忌麻苧線懸之至除夜用五方草又方用馬齒莧秋間採貯同桃符木相以水同煎放冷元日五更俗過歲之箔內每十數日日高時一出每陰雨止卽便晒曝又方採野花韭花桃花白豆花於二月十二日採之中而浴之放子也一夜而止否則生蛾也不齊浴連不得見日產婦與未滿月孕婦勿用綿絮包裹切近鐵銅塩灰如或不忌多乾死

出蠶蟻○三月穀雨出蠶蟻令蠶母洗手淨潔凡切葉飼養擡布之際並當如此將箔中蠶種還於無風溫室懸掛太高則傷風太卑則傷土凡蠶種初變紅肥再變如春柳色三變如遠山色周盤其中此收之種

也若頂平焦乾蒼黃赤色此不用之種也○蠶種變色遲速由已勿致損傷自變桑葉已生自辰巳間將箔內取出叙卷提掇亦無度數但要第一日變三分第二日變七分却用紙密糊封了還箔內收藏至第三日午時又出連叙卷須要變至十分下蟻○蠶變灰色已全以兩連相合鋪淨箔上緊捲兩頭繩束卓立於無烟淨涼房內第三日晚取出展箔蟻不出為上若有先出者名曰行馬留則蠶不齊須以鷄翎掃去不用又云不可以鵝翎掃掇蓋蠶生不齊則其眠起至老俱不能齊故曰蠶欲三齊子齊蟻齊蠶齊是也候蟻齊生和蟻秤連記寫分兩多少用細切擣軟稈草均鋪箔上為蓐又採淨紙粘鋪蓐上便取桑葉一云着懷中令暖

細切如絲髮篩於蓐紙上務令均薄將連合於葉上蟻自下連
緣葉有不下者輕輕振下○勿用鷄翎等物拂掃恐驚傷或過時不下連及緣上連背者
此殘病蟻也並連棄了却秤空連使知蠶分兩蟻可布一箔至
老可分三十箔每蟻一錢即爲老蠶一箔量葉放蟻愼勿貪多
不然則勞而無功矣如桑可飼十箔蚕必須養蚕七八箔可也
飼蠶○蟻初生色黑漸漸加食至第三日巳午時擘如小碁子布
于箔中漸漸飼葉一云擘黑一云分蟻○桑必擇佳品叅考桑條初一日一辰
可飼四頓一晝夜四飼十八頓或三十六頓第二日飼至三十
頓第三日亦飼三十頓當用心勤飼○初飼蟻時旋摘細葉用
利刀細切用篩篩下不住頻飼蓋旋摘則不乾非利刀則無液

非細切則蓋蟻非篩（似是細竹篩）則不均桑搓微液不能久存必須先枯故頻飼也

初眠（一曰頭眠又云正眠）○黑蟻變白則向食宜少加厚變青則正食宜益加厚變白則慢食宜少減變黃則短食宜愈減純黃則停食謂之正眠○頭眠擡飼候十分眠纔可住食至十分起方可投食（若八九分起便飼之直至蠶已老都不齊）一晝夜可飼六頓次日可漸次加葉○向黃之時宜極暖眠起時却要微暖起後天氣清明巳午時間暫捲窗間葦簾以通風日（南風則捲北窗北風則捲南窗放入風氣不傷蠶）

再眠（一曰停眠）○正眠起後自黃而白食宜少加自白而青食宜益加自青復白食宜少減自白而黃食宜愈減此又一眠也○向眠

時見黃光便住食擡解直候起齊慢飼葉宜薄糝厚則多傷一晝夜只可飼四頓次日漸漸加葉○眠起時宜溫和起後天氣清明通風如上法

大眠○直候十分起齊投食一晝夜三頓次日加葉至第七八頓午後天氣清暖取菉豆麵白米麵或黑豆熟麵右等麵預先磨下以待之與切下葉一處微用溫水拌勻一箔可飼麵十餘兩却減葉三四則隔一日再如此飼一頓不惟解蠶熱毒又省桑葉仍得絲多易繰堅韌有色○大眠後喫食十五六頓即老得絲多少全在此數日不可怠慢日見有老者量分數減飼候十蠶九老方可

八簇○大眠後飼罷三頓捲簾去紙窻以透風日不必頓驚生

病雖大眠後喜涼亦避猛風若天氣炎熱門户置缸旋添新水以生凉如遇風雨夜凉却將簾幃放下

飼蠶總論○蠶必晝夜飼飼要均若頓數多者蠶必早老少者遲老二十五日老一箔可得絲二十五兩二十八日老得絲二十兩若月餘或四十日老止得絲十餘兩○若值陰雨天寒比及飼蠶先用乾桑柴或去華稈草一把點火繞箔照過煏出寒濕之氣然後飼之則蠶不生病○蠶食雨濕葉及洽露濕葉則放白水成白殭食風日所乾葉及舊乾熱葉則生腹結食浥臭葉則生諸疾濕葉則有可制之法芟葉積實苫席覆之少時内發蒸熱審其得所發葉攤之濕隨氣和葉亦不寒即可飼之至乾

葉臭葉則無可製之法棄之可也○採桑歸必踈棄於室中出熱氣後乃與食○育蠶而缺葉以甘草水洒葉次以粉糝之候乾與食可度一日夜成繭亦厚實謂之齋蠶惟懼人知俗方蚕似有不實退老之勢以蠻椒糝之一新矣○凡蠶好成則一間可得繭八九斗以一箔稱一間

分擡總論○蠶滋多必須分之砍燠厚必須擡之失分則不勝稠疊失擡則不勝蒸熱故分擡宜頻往食即時分擡每擡之後布蠶若稠則強者得食弱者不得食必挠箔遊走且於擡時久堆亂積遠擲高抛則蠶身相纏損傷生疾切宜稀布而安歇也布蚕時從高擲下則蚕身相撞已後簇內懶老翁赤蝎是也

凉暖總論○自蟻初生至兩眠蠶室正要溫暖蠶母須著單衣自

覺身寒則蠶亦寒便添熱火自覺身熱則酌量去火至大眠後
天氣炎熱却要屋內清涼○晝夜之間大槩亦分四時朝暮如
春秋正晝如夏深夜如冬寒暄不一用火斟酌多少不宜一例
八宜○方眠時宜暗眠起後宜明蠶小並向眠時宜暖宜暗蠶大
並起時宜凉宜明向食時宜加葉緊飼新起時宜薄葉慢飼
蠶忌○烟熏煎煿魚肉燒皮毛燃火紙吹滅延臭穢酒醋五辛羶
腥麝香等物室宇掃塵埃西照日當日迎風倉卒開門暗值賊
風燈火射窗敲擊門戶放刀竈上屋內哭泣呼嗔穢言淫辭産
婦孝子不潔人入蠶室帶酒切葉飼蠶摟解布蠶未滿月產婦
不宜作蠶母蠶婦不宜頻衣服○蠶陽物火忌水故食而不飲

蠶畏鼓聲與雷聲伏而不起

晚蠶○又有夏蠶秋蠶名曰晚蠶夏蠶自蟻至老俱宜凉惟忌蚊蝇必設帳而衛之秋蠶初宜凉漸漸宜暖養法同前○夏蠶不中繰絲惟堪綿纊而已夏蠶不宜多育或育之擘黑後須一日早辰一擡其沙

繰絲附○凡繭宜擇凉處薄攤蛾自遲出免使押絲相逼如不及則有篭浥籠蒸之法繰絲之訣惟在細圓緊勻無粗節不勻也繰絲不及者用淹繭法缸大則入四兩鹽荷葉包之與繭同停在缸內又以荷葉塞實缸口外用泥固頻視之泥乾有小罅則蛾生宜添泥封隙如此至七日而蛾死不復生○俗方新繭除置可以作種者其餘曬乾於烈日中三四日後收之則蛾不出若值陰雨鋪乾於熱炕之內亦三四日收之○長而瑩白者細絲之繭大而晦色青

蒸者粗絲之繭皆掙去其蒙戎之衣然後繅之其內潰而漬之漏者薄而雜者出蛾者繅湯無緒撈出者繭外衣蒙茸者並只合於綿纏而已漬漏者雜者如欲為粗絲不可以經日經日則絲爛而難抽不可以焚香焚香則蛆穴而難抽○繅絲有熱釜冷盆之異然皆有繅車絲軖然後可用大釜要大甑置于釜上甑中入水滿甑中用一棍攔斷可用二人對繅水須常熱旋旋下繭多下則緒不及纏損些可麁絲單繳者雙繳亦可但不如冷盆所繅潔淨光瑩也冷盆要大先泥其外用時添水八九分水宜溫暖長匀無令乍寒乍熱可繅全繳細絲中等繭可繅雙繳比熱釜者有精神而又堅韌也

育蠶總論　凡育蠶之時必勤驅蠅子蓋蠅子坐蠶頂背之上以喙穿穴吸汁又遺種而去其穴卽合仍成小黑點至蠶老成繭薄劣旋有蛆穿繭而出繭無用矣○蠶簇必一一懸於架上層層倒垂使不着地地上則藉以稻草接承墮下之蠶切不可積薪於地上蠶作繭若賊鼠潛意隱伏無可奈何故懸簇則免此患矣○育蠶固人家常業然亦不可歲歲廣育者似有損於陰功故也曾見繰絲時投繭於熱湯中則其繭急動旋轉於湯面蓋其蠶蛹尚有生意不耐其焦爛之致也急於資生多行不忍之事豈仁者心乎然不可全廢是業每年只育三四間蠶以備老人襯身細衣及略干壽服可也○春初癘疫始行切不可育蠶

何也曾有砥平村民世以蠶桑專業家頗豐饒歲當疫氣熾盛而猶育數十間蠶蠶老將入簇一室沒數痛臥以致採桑無人蠶飢至三兩日無數自散於外隣人之先痛向差者見而憐之連筐運棄於近山之上其蠶遍滿一山烏鳥百羣噪咕爭啄數日乃盡無餘厥後其家復如前育蠶則其蠶稍大便腐爛皆死終無不得一繭之收連年如此因以廢業以此觀之可不戒哉

○蠶老活蠶數箔治消渴神繭蛹水亦止渴白殭蠶治風痰蠶砂治小兒胎毒暑毒又多用糞處藥用須收初眠砂蛹未經痘兒宜喫之蚕蛹及繰絲水治伏暑效

野蠶○食櫟葉而作繭造布堅韌無比而世言人着之不祥此果

何驗未可曉也

儲桑葉方○盛夏多摘桑葉晒乾收納空石中待明年春夏間蠶欲老時水漬乾葉令濕與蠶食之則作繭堅韌甚佳儲葉限百石飼蠶有餘者飼牛亦好

牧養

牛耕田馬載物鷄司晨犬防盜至於羊猪魚鴨之屬可以充庖祭餅牧養之道則可賴而資生矣時或馴擾鶴鹿鸂鶒作伴遣閒亦可

論○既定人居必有常產畜牧之事亦不可少也故每七月間六畜房圈預先整頓以避風雪不使凍損夏亦留心保護勿致傷

熱可也○陶朱公曰子欲富當畜五牸牛馬猪羊驢是也必廣占水草便宜之地誠心畜牧則所得豈其少哉

養牛○作牛牢年月吉日參考卜居○納牛吉日丙寅壬寅乙巳辛亥甲寅戊午酉日乙丑壬申甲戌庚戌癸丑又買牛吉日丙寅丁卯庚午丁丑癸未甲申辛卯丁酉戊戌庚子庚戌辛亥戊午壬戌又宜成收開日又正月寅午戌日六月亥卯未日

相母牛方○毛白乳紅多產毛踈乳黑不產產時犢臥與母面相向數產相背稀產一夜下糞三堆一年一產一堆則三年一產

相耕牛方○眼欲大白脉貫瞳眼去角近角欲細兩根促近體欲麄項骨長大毛欲短窍尾稍長後脚股間謂兩脚門並快則為上○又方頭小腦大頸長身短角方眼圓脊高臂低食毛不分立齊

足〇頸欲瘦小不用多肉面欲方長短則命促尾稍亂毛轉卷
則命短毛踈長者不耐寒
相牛方〇甯戚云眼欲穴穴則有力不穴則少力眼赤者觸人眼
下有旋毛名淚滴不吉鼻欲軟而大易牽鼻如鏡難牽無力鼻
上毛逆肉口欲方大能食齒欲白角向前吉向後凶兩角間有
亂毛妨主角圓紋細耳去角近略可用指方好骨欲長大目欲
得明毛短密而黑者耐寒踈長如鼠毛者怕寒前脚欲直而闊
後脚欲曲而開蹄欲大青黑紫為鐵蹄吉糞如螺旋用力如雷
角欲厚重尾骨麁少毛者有力〇璧堂欲得闊（脚股間也）倚欲得如
絆馬（聚而正也）鷹庭欲得廣（胷前）天關欲得成（脊接骨也）傿骨欲得垂（脊中央欲）

得下蘭株欲得大尾株豐岳欲得大膝株骨也垂頸欲得高首體欲得緊

垂星欲得有努肉垂星蹄上肉覆蹄間名努肉力柱欲得大而成當車骨懸蹄

欲得如八字陰虹屬頸兩筋自尾骨屬頸陽盤欲得廣夾尾株前兩膲口中常

有似鳴者有黃也又云目赤赤洞胡無壽從頸至臆珠淵無壽旋毛當目下上

池角中央也有亂毛妨主凶身欲得促形欲得如卷言其側形大膁踈肋

難飴龍頸突目好跳獅筋欲得成就後橫筋也岐胡壽岐牽兩腋下分為三豨

府方易飴

相毛色法○自牛頭黃角間一尺青赤黑牛頷有台黃黃脊台白

黃黑背有白條並吉餘凶

喂養法○牛之為物切有農用有功於人大矣善養畜者必有愛

重之心順其凉暖時其飢飽節其作食養其血氣若然則皮毛潤澤肥體肥腯力有餘而至老不衰其何困苦羸瘠之有○方舊草凋朽新草未生之時宜取潔淨藁草細剉之和以麩皴糠豆之屬使之微濕槽盛而飽之春秋草茂放牧飲水然後與草則腹不脹至冬月天氣積陰風雪嚴凍即宜處之溫燠之地煮糜粥以啖之預收豆楮之葉舂碎而儲積之以溫米泔和剉草糠麩以飼之又方乾桑葉末蚕砂或綿餅同飼之○冬間每日荳萁即角太三四斗太數升煮熟釜中乘暖拌細剉藁草朝夕餵喂夜又頻與草得十分肨壯然後可以春耕○牛忌放飮晨露之草必生病

牛廐○須夏涼冬暖而必置家內深隱之處固其扃鐍旣傍安猛

夠宿所以備警守盜賊廄前又設木簾法見家政藁網以防虎患○
廄下鋪磚石或木板則牛足必痛滴○春初必去牢欄積糞自
此以後旬日一除免穢氣蒸欝為患且使無浸漬蹄甲以生疾
○廄地上鋪塲上糠穰使牛脚踏下糞次日又以糠穰覆之每
日一覆十日除之春夏則鋪雜草櫟葉之屬使牛踏且糞尿之
每四五日一除而積之
牛衣○上用荻草結綴則利水下用蘆花結絡則溫煖相連織成
如結簑衣法遇極寒鼻流黴涕腰軟無力將簑衣搭牛脊背用
麻繩絟繫免致凍損也
耕法○每遇耕作之月晝以放牧夜復飽飼至五更初乘日未出

天氣涼而用之則力倍於常半日而勝一日之功日高熱喘便令體息勿竭其力以致困乏此南方晝耕之法也若夫北方陸地平遠牛皆夜耕以避晝熱夜半仍以芻豆助其力至明耕畢放去蓋飢欲食渴欲飲即物之情也至於役使困乏氣喘汗流耕者爭于就食或放之山或逐之水牛之七竅皆空踈筋力疲乏顛蹶而僵仆者往往相籍利其力而傷其生豈愛養之道哉

○家有一牛可代七人之力一云無牛者備九人挽犂可代一牛之力日耕可種二三十斗如

教小牛必令慣耕老牛同負犂耙使其純熟自然知耕道矣○

凡牛老疲或病殘不堪使者不可賣諸屠肆雖自斃者亦不許隣人剝割食之即便埋之蓋有功之物不忍如此故也且使牛

不見屠牛之狀牛必生病

牛雜病牛之為病不一其用藥與人相似但大為劑以飲之無不愈者溺有血傷於熱也以血藥治之冷結則鼻乾不喘以發散藥投之熱結則鼻汗而喘以清利藥投之其或天行疫多薰蒸相染則牽避他所拔除沴氣而救藥或可偷生也○牛患氣脹病冷熱相衝傷重損脾先用攻胃散白芷一兩茴香一兩一錢桔梗一兩二錢蒼朮一兩三錢細辛一兩一錢芍藥一兩三錢橘皮九錢半官桂一兩一錢右為末每服一兩用生薑一兩盞水一升同煎温灌之○牛忽肚脹狂走觸人用大黃黃蓮各五錢鷄子清一箇酒一桃和匀灌之○牛喫雜虫腹脹用燕子屎一合水或酒調灌之○牛多食生豆腹脹垂死者研麻子作汁五升温令熱灌口中甚良○牛肚脹及嗽取榆白皮水煮熟甚滑以三五手灌之即差○牛

糞血用當歸紅花爲末酒煮一合（或曰酒浸一桃）灌之效○又方取竈中黄土二兩酒一升煎候冷灌之○牛尾焦不食水草用大黄白芷黄蓮各五錢爲末以鷄子清一箇酒調灌之立效○凡牛不吃治方青木香（四錢）金銀花（一斤）共煎湯灌下立效○牛鼻汁脹（浮高）用釅醋（好醋）一盞灌耳中立差○牛眼遮白脉用砂盬並竹節燒存性細研一錢點膜上○牛身上生虫用當歸搗爛醋浸一宿塗之○牛爛肩用舊絮三兩燒存性麻油（真油）調付忌水五日○牛漏蹄用紫礦（木脂液結成形若爛石與血竭同條）爲末猪脂和填漏蹄中燒鐵烙之○牛咳嗽用盬（一兩）豉汁一升相和灌之○牛以鬼氣身戰汗出口鼻冷先灌盬湯一升細切葱白一握好酒一升同煎三

五沸灌之如不差更灌之轉胞者難治(以血轉胞溺塞者也)○牛患熱病
口黄黑色似青泥四脚不收用白术散白术(二兩半)蒼术(四兩二錢)紫
菀(三兩三錢)牛膝(二兩二錢)麻黄(去節三兩)厚朴(三兩一錢)當歸(三兩半)藁本(三兩三錢)右
細末每服二兩用酒二升煎放温草後灌之即差○一方用胡
麻葉(거믄ᄎᆞᆷᄭᅢ닙)擣汁灌之立差○一方青蘘(ᄎᆞᆷᄭᅢ닙)煎水灌之○牛
病後膓結不得放糞白术二升浸一宿研取汁生油半升相和
灌之差○牛疥癩用藜蘆(박새)爲末水調塗之妙○蕎麥穰(모밀ᄂᆞ뎡)
(이)燒灰淋洗之○煮烏豆汁熱洗五度差○牛虱以胡麻油塗
之即愈猪肚亦得六畜虱塗之亦愈○牛瘦活鱔納竹筒灌之
易肥○牛舌腫脹伸出口外不收者取草麻油蘸紙撚燒烟熏

之而愈治人亦效○牛發痘斑以青蒿作粥喫之○牛馬百病柳葉
生牛乳同擣令爛丸如彈子晒乾用時擣細末仍和生牛乳灌
之神效○牛病用牛膽一箇灌口中差○牛馬六畜因食水穀
有傷并瘟疫用酒加些麝香末灌之神效○一方用酒麵煎汁
灌之立消○牛子死腹中以朴硝煎湯灌之真奇方人與六畜同效○
牛疫預防法有病氣千金木붉나모斫取擣瀝又取葉剉和草飼
之又煑葉待冷令飲之或灌之又牛欄中燒安息香即此木之脂液蒼
朮以鼻吸香止○疫延處先用小便使未病牛飲之日三四次
則不傳染常時牛喜人小便男子直放注其口則自能接飲最
爲神效○赭朱土塗於牛角上辟惡○未發時預以羊蹄솔옷汁二

三升灌口始發亦灌○未發時吐涎者是瘟疫也取黃栢研汁
白石燒灰二種以酒調和灌口以防之○先吐涎不止者取真
墨研汁藍汁各三合石灰一合酒半升相和灌之○牛得急卒
之疫以頭打脇者用巴豆七箇去殼擣爛以麻油참기름和灌之
又方巴豆兩箇如無則大黃五錢作末和生油一兩淡醬水半升灌之仍用皂角末주엽가로一撮吹
入鼻中更用鞋底신바닥於尾停骨下꼬리부른뼈아래拍打之或云噎也牛用皂
角末鞋底打法○牛疫芭蕉根汁一椀灌口連三日則雖毒疫必差但
此草預多種之以備牛疫○一方用石菖蒲淡竹葉菖粉鬱金
菉豆蒼朮等分爲末每一兩芭蕉自然汁三升入蜜一兩黃蠟
二錢調和灌之未解則再灌熱極加大黃鼻頭無汗加麻黃臭

口出血加蒲黃○一方臘月糟술쥬어미一大升赤茯苓末四兩石蒲末大黃末各二兩地黃汁一升醋半升小便一大升調和灌隔日一灌五度即止仍鍼鼻毛際一分許出血差○一方大黃柴胡各一兩剉水煎灌之立差或單用大黃二兩水煎分兩次灌之以下泄爲限曾見疫牛有至死泄者豈毒耶○一方黃栢剉水煎無量灌口○眞雀舌茶二兩爲末和水五升灌之○臘月兎頭預先備待燒灰和水五升灌之○狐頭尾燒灰和水灌之狐腸灰亦好○地龍多取納牛口中抑其吭使下以差爲度○取蟾蜍之放溺去皮頭取肉擣爛和水灌之○屎秘以油塗手探穀道去結屎以通爲度

○牛馬時疫並治方獺너구리肉皮屎或肝肚水煮汁待冷灌之

○猛毒黑豆煮水灌之○時疫用白朮藜蘆川芎細辛鬼臼(두어머쥬저기)石菖蒲等分粗末燒熏兩鼻令烟入腹卽愈○初發時身體中有小腫仔細審之以燒鐵條烙其腫處又冷水浸豎令體寒爲度又以艾炷如小指大灸神闕(卽臍中)中三壯○牛馬六畜疫並治方酒和麝香少許灌之

養馬○相良馬法(圖見下)頭欲高峻面如剝兎(去皮兎也)眼似垂鈴眼下有肉腦骨欲圓耳如削竹食槽(頰也)欲寬鼻要寬大上唇欲方口叉(口咖)欲深下唇欲圓頰骨欲圓頂長彎曲宗鬃薄茸細前看似鳴鷄臆欲平鬐甲(몬다외)欲高脊梁欲平(排鞍길마肉厚지리)肋扇骨(가리倂)窩腰短促後看似狗蹲膝骨圓脛(종아리)骨細前蹄圓大而直掌

骨(바당 [illegible])高尾骨短尾欲茸細汗溝欲深外腎小腿如琵琶曲池深後脚欲曲鹿節骨細後蹄尖肚(腹也)下生逆毛腹欲平隷鐙(등ᄌᆞ)살肉厚前脚直筋(脛骨肉筋)欲麁眼似垂鈴而紫色浸睛睛要分明而白縷貫睛日行五百里目赤反([illegible])睫者善走瞳生五彩則壽高眼大則心大而猛利不驚耳小則肝小而識人意獐頭麁耳獅口雖風耳毫一尺價直千金耳徵一寸行千里口深而口中色紅光者千里馬舌如垂劒而色似蓮花肋骨過十二條者良三山骨平則易肥頷下欲深額欲方平耳下入肉大而明眼下直下骨欲直脗壁欲開而壁如雞冠虎口(다리ᄉᆞ이)欲開夜眼(밤눈)欲大尿過前蹄及尿時擧一脚尿而似犬者皆一行五百里四

蹄圓實而卓立羊鬚俗稱셕의치有距뎜발음距如鷄爪者日行千里

骨角逡生蹄曰龍駒初産無毛是謂龍種目有重瞳勿輕覷○

凡馬耳短小性最快鼻大能奔四蹄實則能負重且眼大鼻大

筋骨壯行立好口內紅便是可畜之馬

辨駑馬形狀圖見下○頭大而重耳闊慢大口又淺下唇急頰薄冷

項麁短筋細皮急毛麁膁大蹄下實足腕足項小膝骨小腕下肉

急脇下肋短腹大而垂後脚直脊高而直筋骨稀三山高尾本

高伍리미汗溝淺而不明腹挾腰凹腿僶나리죵나羊眼象目猪腰蛇

腰皆不能奔

辨三羸五駑法○大頭小頸一羸弱脊大腹二羸小脛大蹄三羸

大頭緩耳一駑長頸不折二駑短上長下三駑大髂短脇四駑淺髖薄髀髖볼기ㅅ이髀궁동이五駑也

相旋毛吉凶歌圖見下○項上騰蛇旋應爲不利長喪門兼挾刀元來不稱良生額角啣禍爲禍固非常啣口邊殺衝時時逢主傷黑色耳全白從來𨇾𨇾頭雖是千里足奉勸不須留帶細彈間事喪門不可逢搭耳骫鬃項鱉尾兼則凶眼下生旋毛遶首以淚痕古人如此說莫謂是虛言

相凶馬法○白首黑身銀鬃玉頂耳白腰花沙睛눈방울이目부희다環眼面短肉橫眼深無肉白從額上入口者名曰俞膺又名的盧奴乘客死主乘棄市大凶馬也左脇有白毛直上名曰帶刀不利

人白馬四足黑者黃馬白口者並凶後左右足白者殺婦膝骨
圓大而如盃汗溝上通尾本者踏殺人目赤反睫者善走傷人
目下有橫毛者不利人○眼下無肉多咬人世言腎囊毛長咬踢齒左右
蹉不相當難御目不四滿不愛人下唇急亦然

相馬壽夭法○眼中五彩俱及眼箱下눈어여有字形壽九十鼻上
紋如王字公字壽五十如火字四十如天字三十如山字水字
二十如介字十八如四字八歲如宅字七歲旋毛在眼箱上四
十在箱骨눈어여ᄲᅢ中三十在中箱下가온ᄃᆡ어여十八口中見紅白光
如穴中着火者壽若黑不旋明盤不通明者不壽盤言周回也

相馬齒法圖見下○夫齒者骨之精粹其盛者雖上下咬平달아평ᄒᆞ다

猶有鋒刃而行力依然其壽無可考也骨氣衰敗者未二十歲
區臼俱平而無鋒刃雖能食亦無其力是故駑駿於此亦驗矣
齒不周密不久病不補不厚不能久走一歲駒齒二二歲駒齒四三歲駒齒六四
歲成齒二成者言非吮乳齒五歲成齒四六歲肉牙生七歲角區缺가에
골히여ᄃᆞ러지나八歲盡臼如一골히여ᄒᆞᆫ갈갓다九歲咬下中區二齒白中下
골히여ᄃᆞᆯ고두나희나十歲咬下中區四齒희ᄒᆞ十一歲咬下中區六齒白十二
歲咬下中區二齒平十三歲四齒平十四歲六齒平十五歲咬上中區
二齒白十六歲四齒白十七歲六齒白十八歲咬下中區二齒平十九歲
四齒平二十歲六齒平卽上下咬盡平也自二十一歲至二十三歲
咬下中區如上法次第黃自二十四歲至二十六歲咬上中區

又如上法次芽黄此時則上下咬盡黄也自二十七歲至二十
九歲自下咬如上法次芽白自三十歲至三十二歲自上咬如
上法次芽白此時則上下咬盡白也

驗馬無疾○舌如蓮花唇似桃花四肢輕健糞潤尿清睛不迷皮
毛光彩精神多鼻氣溫和頸尾不動輪歇後蹄

驗馬有疾○口腥舌𦆵顏色無形狀雖常鼻流膿涕連嗽不已皮
毛焦瘦頭低耳搭다리다精神少四肢困怠行步遲回面浮鼻腫
踶睛閉腹細腰弓喘息微

馬有天生三病○蹄薄而不能致遠前蹄블으다不能即驟後蹄不
能登峻此三者胎病無方治之

養馬法○造廄吉日(參考卜居)○買馬吉日乙亥乙酉戊子壬辰乙巳壬子己未又宜成收日○刀砧血忌血支日忌騸馬劃鼻行鍼徹血火烙又忌馬本命日忌治病鍼灸九月巳日十月亥日十一月午日十二月子日每月午日(午地忌造馬廄)○馬火畜也其性惡濕利居高燥宜南拴不宜北繫(言繫宜向南也)冬須暖廄夏必涼棚槽櫃須令潔淨毋得雜以羽髮蛛絲砂石灰土諸雜惡穢之物食之即瘦瘁生病矣

喂草料法○須平槽行相離稀闊須揀擇新草篩簸粟豆(忌飼赤豆令馬脚重)若熟料用新汲水浸陶放冷方可喂之切忌凍料宿水(읻믈)每夜二三次起喂草若馬膘(肥也)大或騎出或炙熱休加熟料、飢

時與惡芻飽時與善芻引之令食常飽則無不肥剉草麁雖足

豆穀亦不肥又細剉無節而飼之則肥○飢腸勿喂飽出門休

喂飽遠来毋喂飽

飲水法○一日三次朝飲少之晝飲酌其中暮飲極之過夜不飲飲時

宜以新水忌宿水濁水沫水거품夏暵冬寒亦節飲大㬂喂水不

謹亦能成疾○行路時毋得飲水尤忌延歇處○冬月飲訖便

須騎驟一云摩行即無傷○騎來毋得飲料後毋得飲有汗毋飢渴

休飲足低䯝休飲足妊娠休飲足○或以盥水飲者勿多多則

損其腰腹以成腎冷致後失矣

馬遠回喂養法○冬春遠回騎勞汗出則勿去鞍徐徐刷毛待其

喘息平定汗收後始去鞍着䩞音테俗검언치移時飲喂則使馬不致外感風寒矣先飼長草一束後與切草良久又以料二三升和水草啖之又淨水一大斗切草與料三四升和啖常飲淨水○凡騎馬遠行歇宜早喂宜遲未喂之先飲水數口方可飼草不爾必有中結之症

放牧法○五月後勿放至秋放牧八月墜時一日騎出微汗勿過勞着草馬夜過夜收汗平明刷之無穗長草一二束喂之飲冷水一二碗一息乃止還放隔十日如前法必加勞養良馬五度常馬三度若馬八九月不肥草枯前給料豈肥飼稷宜馬吃露草則清熱易肥○苦霖嚴霜必致憔悴生病宜收之

飼征馬令硬實法○細剉芻𥰭揚去葉全取莖和豆穀喂之置槽於露地雖雪寒勿令安廠下（廊底）一日一走令其肉熱則馬得硬實而耐寒也

劃鼻法○馬四五歲有臕（肥也）者方許劃蓋寬通鼻孔令馬不生熱疾之法也（擇天氣清明早晨空草將馬縛於高柱用好櫳頭啌束定馬頭正立穩平左手執欟填於鼻孔右手持利刃自下而上劃之驢彎馬直左右勻停以新水淨洗血出拴養淨室七日朝夕扯拔不致卷縮生合十日愈）

治惡馬法○牛肉爛搗食之性即善○咬人以殭蠶拭馬唇內外即不咬人（殭蚕末塗馬齒則不喂草以桑葉拭去復喂草）

灌藥法○凡灌藥之法縛馬捲上從上灌下蓋恐藥入喉門則鼻流黃水便死故也我東則縛倒馬灌之此是危方必令熱手用

心灌藥可也

治馬瘦○馬喂而不肥者是有瘦虫也煮料時貫衆一二枚同煮久久喂之虫出而肥○猪膽或狗膽汁和料啗之則肥○馬雖食草料腹不能充人参甘草白朮當歸各二錢大黄六錢貫衆五分爲末無水酒一鍾真油一盞鷄卵一箇和之早朝灌口高繫不啗水草午後方啗水草未愈再服

馬雜病○馬目暈用霜後乾穀樹即楮白皮葉爲細末一日兩度以蘆管吹入眼中○馬眼骨눈에치以指尖反出肉皆細察則中有似魚鱗狀者非肉非骨名曰閃骨先用線鍼度量膜皮間貫而引之以利鍼割去閃骨不損血輪可也○初發未甚時削杻木如

箆子狀以鍼橫刺頂上旋毛中向上直刺二寸即差後經宿撥去以熔蠟塞其穴誤觸風及頸腫而死○初有氣亂髮燒熏鼻中流涕至流膿涕則愈又方爛茅草燒熏鼻中○初發時百草霜鹽炒等分細末一錢納眼中即差○熊膽小豆大細研毒酒(燒酒)一鍾半和勻徐徐灌之後腹痛一日不給料即差○凡馬眼骨後腹痛及諸他腹痛灸神闕穴(臍中)五十壯神驗○俗方反內眥納大豆各一枚任其自潤脫出差○又鯉魚膽小許納內眥○水荏子小許以手揉破作丸如菉豆大納目眥內鼻出黃水差○鼻孔內近上數寸許以鍼貫刺出血又刺兩耳內尖○又刺尾尖上凡病眼骨馬施治後即起立振背放尿喂草是欲差

也如有腹痛灌燒酒一大鍾即馳驟少時○馬不進水草鷄卵一箇去殻取水真油三合清蜜三合熊膽一錢半大蒜一瓣爛研豆淋酒（取黒豆炒令極熱投酒中即豆淋酒）一升和空心灌之至夕先與草料飽後少與水一手徐徐飲之不愈再灌○俗方馬熱不食以奴僕所着弊襪襪洗取其汁不飲又灌之卽差○馬傷水蹄驟緊急喘息未定時遇水飲之須臾間兩耳並鼻息皆冷反流冷涕即此症也用葱白一握鹽一兩許擣爲泥罨於兩鼻內須臾打嚏清水流出是其效也○一方前方內加油揉成團納鼻中以手捉馬鼻令不通氣良久待眼淚出即止○先燒亂髮熏兩鼻後用川烏草烏白芷胡椒猪牙皂角各等分麝香少許爲細末

用竹筒盛藥一字二分半吹入鼻中須臾打嚏清水流即效更加
芥薷等分用之則兼治傷中水結一切病症其效如神不效再
吹○馬前結皆因料後乗騎急驟歸来又喂喘息未定口涎未
清以致痰裹草料相和一塊遶入大腸前面成結也令馬肚腹
脹痛咬臆跑胎不時卧地足仰朝天用通關散續隨子滑石木
通鼠糞黑丑酥油一合皂角炙右為末每二兩生油四兩灰湯半
盞苦酒醋一升調煎三沸入大黄末硝各一兩灌之不住牽行用
篝於腹下刮之○馬中結穀草積於大腸中面之症也令馬肚
腹脹痛仆卧跑胎連連卧起鼻將喘粗將馬縛倒先以温燒油
水三升灌入穀道中然後使小手者再將油塗手臂上下徐徐

入手於大腸中輕輕搜尋如遇滑硬如毬打手者即是結糞撞破其糞便時見效若人手短難取馮價丸灌之五靈脂牽牛甘遂大戟續隨子大黃滑石香附子瞿麥木通各二兩 右為末醋糊丸彈子大每一丸碎溫酒和生油四兩灌之調理上同○用雄雞一隻勿用刀割以拳提死趁熱便開破肚取心肝腸嘴爪甲帶糞入風和石灰一合舂碎剝爛入真芝麻油四兩調勻灌之立效雞不用只用肚中物○又方大黃郁李仁穿山甲炒黃各一兩 風和石灰一升○如無代朴硝四兩為細末作一服真麻油四兩釅醋一升調勻灌之立效如灌藥不透用豬牙皂角為細末和真麻油四兩填納於穀道中再灌前藥一服即時便透○馮後結草穀積於大腸後面

之症也令馬肚腹飽脹觀後回頭起而復卧卧而復起必用上
手取法不然用打結丸續隨子四两郁李仁一两皂角半两瞿麥一两鼠
糞四两榆白皮二两牽牛一两芫花二两醋炒右為末麵糊丸彈子大每一
丸碎與細切青葱三根苦酒一盞同煎三沸入生油四两童便
半盞灌之調理上同○馬大小便不通卧居欲死急治可救以
脂或油塗人手探穀道去結糞又以塩納溺道中溺出便差○
小便不通滑石一两朴硝木通黑丑各二两為末同温水灌之未通
再灌○大便不通俗方南蠻椒一握碎納穀道中○馬泄瀉好
麵末微炒四两蒼朮末四两温油湯調灌之未愈再灌○治腸御瀉
者令馬肛門御瀉水腹内如雷多飲少食臁吊毛焦用猪苓散

猪苓澤瀉青皮陳皮茯苓牽牛作末每二兩粟米二合煮粥同
調灌之後以無根水洗口鼻立痊調理飲休足飲了牽行百步
空腸冷水三日忌之○馬轉胞此名腸結令馬肚腹脹痛踏地
蹲腰欲卧不卧打尾跑蹄用滑石散滑石澤瀉燈心茵陳知母
黃栢酒炒猪苓右末每二兩水一升調煎三沸入童便半盞空草
熱灌○用細辛防風芍藥各一兩以鹽一盞水五盞煮取二盞分
爲二服灌後又用芒硝鬱金寒水石大青各一兩水五盞煎至半
以酒油各半盞調勻分二服灌口中效○用小兒尿和水灌之
立差搗蒜納小便孔中深五寸亦可○馬溺血秦艽散秦艽蒲
黃瞿麥當歸黃芩甘草紅花大黃芍藥梔子天花粉車前子右

爲末每服一兩半青竹葉煎湯一盞同調空草灌之又竹葉喂之勿騎驟○馬噎草奔走遠來啣環未卸猝然喂草嚼不能細嚼之太猛遂草成塊至咽中半而噎令馬伸頸縮項鼻口回迸連連哽嗽氣促喘麁治法遊韁只吊繫後脚牽往高坡趕返急行十數遭噎自下矣油水灌之噎通暫停草料○馬傷料喂養盛而少騎穀氣凝於脾胃腸中不能運化邪熱妄行令馬神昏似醉眼閉頭低拘行裝束四足如攢用麯蘖散神曲麥芽山査肉甘草厚朴只角陳皮青皮蒼术右爲末每服二兩生油二兩生蘿蔔一箇擣爛童便一升同調灌之○馬五臟哽嗽肺哽嗽而喘息有音鼻流膿涕甚則屁氣放出遺糞宜白芨散白芨茵陳梔子甘草黃連防風各四兩杏仁一兩半阿膠珠二兩右爲末每服二兩生姜一箇研水一升煎三沸草飽灌之心哽哽

而前蹄跑甚則咬齒頭垂於地宜連翹散連翹吉更貝母紫蘓瓜蔞仁杏仁白芷山藥知母甜瓜子馬兜鈴當歸右為末每服二兩蜜二兩薑三片水一升煎草後灌之肝啌啌而頭則左顧甚則口吐涎宜枇杷散枇杷葉欵冬花知母瓜蔞仁蘓子乾地黃自然銅紅花子天門冬麥門冬馬兜鈴山藥杏仁貝母紫菀秦艽當歸芍藥木通甘草瞿麥沒藥阿膠珠地龍黃連右為末每服二兩童便一升同煎草後灌之

脾啌啌而頭則右顧甚而嘔吐則出長虫宜百部散百部根三兩枇杷葉去毛四兩青皮二兩厚朴一兩右為末分作三服葱二茎糯米粥半盞酒半升同調草後灌之腎啌啌則懸其後腳甚則小便而遺溺宜沒藥散沒藥當歸玄參白藥子甜瓜子自然銅醋炮貝母紅花白芷秦艽右為末每服兩半虀沸半盞煎沸入童便半盞同調灌之

上五方各治五臟啌而肺啌甚又用漢防已散漢防已白丑欵冬花陳皮甘草知母桑白皮黃連木通杏仁去皮尖右末每服一兩蜜二兩生薑三片水一升煎三沸草後灌之

◯馬肚脹奔走太急氣結胸中不能升降

令馬肚腹飽滿膈脹肪膨咽喉哽噎氣促喘麄宜天仙散天仙子當
歸連翹大黃白芷貝母黑丑百合甘草白芍藥右末每服二兩蜜二兩薤汁一升同調灌之○馬猝熱腹脹
起卧欲死藍汁二升和冷水二升灌之立效○馬喉骨脹此熱
極三喉之症令馬食槽脹腫硬核填喉伸頸直項鼻孔流濃水
草難嚥喉嗽連聲宜黃芪散黃芪當歸欝金甘草梔子黃芩黃連知母貝母吉更末每服二兩蜜
二兩鷄子清二箇新汲水二升同調草後灌之徹骨脉血忌生料休拴暖處○俗方幼
駒此病稱項病멱병猶小兒之疸必經一次乃已未病前手摸喉
下有結核如鷄卵者用艾炷多灸則核自散或云以大鍼裂皮
核出核子用藥貼裂處待差好○馬頰骨脹取羊蹄根솔옷四十
九箇燒炭熨骨上冷則換楊柳枝脂大者灸熨亦可○馬鼻內

出膿百合散百合 貝母 大黃 甘草 瓜蔞仁 右末每服一兩 蜜一匙 蕎麥一匙 蘿蔔湯一盞調灌之○馬熱
痛即傷暑症令馬低頭眼閉行立如痿臥多立少惡熱喜冷宜
香薷散香薷 黃連 黃芩 甘草 柴胡 當歸 連翹 山梔子 天花粉 右末每二兩 蜜二兩 漿水半升 童便半盞同調草後灌
之忌料休拴暖處徹鵰脉血水浸青草喂之○馬患心經伏熱唇舌赤腫口內垂涎
精神困倦兩眼如朱宜洗心散天花粉 木通 黃芩 黃連 連翹 茯神 黃栢 山查子 白芷 吉更 牛旁
子 右末每服二兩 蜜二兩 米泔水一升同調草飽灌之宜凉拴 生料忌之 徹胸堂血○俗方茅根造簑衣者淨
洗剉喂菜豆亦飼之○馬肺風毛燥熱積心胸傳於肺則令馬
渾身搔痒遍體風生皮肌揩擦脫落鬃毛宜五蔘散人蔘 苦蔘 玄蔘 紫蔘
沙蔘 秦艽 何首烏 右末每服半兩 蜜二兩 酸漿水一盞 即粟米泔也 皂莢一挺 擂碎取汁半盞同調灌之 徹鵰脉血 勿近灰地
洗宜甘草湯甘草 藜蘆 防風 荊芥 皂角 苦蔘 黃栢 薄荷 臭椿皮 疑樗皮 右剉水煎三升 三五沸 去滓 熱洗 候乾 以

蠟燭油搽之○馬破傷風馬體中或有瘡破處磨巷賊風因虛入皮膚令馬渾身麻痺眼急驚狂四肢強硬口內垂涎耳緊尾直牙關難開不食水草宜千金散蔓荊子旋覆花白殭蚕何首烏桑螵蛸天南星天麻烏蛇沙參防風阿膠川芎羌活蟬殻細辛乾蠍一云蝎升麻藿香獨活右末每一兩溫水一盞調灌天陰薑湯調灌○喂處宜溫徹鶻脉血

○馬肺寒吐沫令馬精神困倦耳搭頭低頻頻咬齒吐沫垂涎唇赤者熱白者寒須詳審之宜半夏散半夏升麻防風飛礬右末每兩半蕎麵一匙蜜一匙生薑一片酸漿水一升同調草餧灌之

○馬黑汗渾身肉顫汗出如油行如醉人目瞪頭低宜茯神散茯神三錢朱砂雄黃各一錢右末糞浸水半盞擅穢取汁猪膽汁半盞同調灌之徹鶻脉血又以利刀於尾尖穴上十字劈之以襯衣蒙腦井華水頂上澆之切摩行拴暖處○又方乾馬糞安於尾鮭內上用人髮蓋之燒令烟入馬鼻中立效

○馬內障眼此毒氣衝

肝也令馬眼生黄暈掩閉瞳人牽行亂走撞壁衝墻宜瀉肝散石决明草决明龍膽草旋覆花青箱子梔子鬱金黄連甘草右末每一兩半水一升調灌草飽次日又灌之○劆去眼中閃骨眼胸血徹之清朝用井華水頂上澆之草飽休令騎走生料火令喂之○師皇曰烏風起自肝經瞳人掩閉眼珠綠色者不治惟黄暈名曰黄風內障或可治之

○馬肝經風熱肝熱生風令馬眼胞翻瞳皆肉瘀紅睛生翳障眵盛難睜宜防風散防風黄連黄芩青箱子龍膽草荊芥石决明沒藥甘草蟬退草决明右末每二兩蜜二兩鷄子清二箇米泔水一椀同調草後灌之徹太陽血劆閃骨烙睛腧每朝以青布揾温水於口內洗之忌風生料亦忌之

○馬肝熱傳眼睛生白膜眵盛難睜牽行不動耳搭頭低逢物不見宜石决明散石决明黄連沒藥梔子大黄黄芪黄芩鬱金草决明右末每二兩蜜二兩鷄子清二箇米泔水一升同調草飽後灌之○徹太陽穴冬春喂菉豆夏秋水浸青草喂之停生料勿令冒風

○馬水冷傷脾令馬渾身發顫覷腹回頭連連卧地鼻咋喘

鹿其痛有五直尾行大腸痛捲尾行小腸痛蹲腰踏地胞經痛
腸鳴泄瀉冷氣痛急起急臥脾經痛宜橘皮散加減青皮陳皮厚朴桂心細辛茴香當歸白芷檳榔右末每二兩葱二莖飛鹽三錢苦酒一升同煎三五沸溫灌之○大腸痛去白芷加蒼朮木通小腸痛加吳茱萸蒼朮胞經痛去茴香加木通只角茵陳滑石冷氣痛加皂角艾葉脾經痛減茴香加白朮甘草鍼四蹄
頭血忌冷水休拴冷處○馬冒冷令馬渾身發顫口吐清涎鼻
寒耳冷膁吊毛焦宜健脾散官桂白朮當歸只角甘草菖蒲厚朴澤瀉升麻半夏赤石脂右末每服二兩生薑一片苦酒同煎三沸溫灌之調理上同○馬寒傷腰胯痛寒濕入腎經傳於
腰胯或閃傷促損瘀血積腰閒令馬前行後拽胯痛腰拖毛焦
膁吊耳搭頭低尻馬寒傷蹲腰行者宜茴香散火鍼大胯汗溝
血閃傷吊腰行者徹尾本血大效忌濕地賊風茴香散茴香白附子川

楝子肉桂肉豆蔻草澄茄檳榔白朮木通巴戟當歸黑丑藁本右末每服兩半鹽三錢苦酒一升煎三沸溫灌空草後溫散高良薑白附子吳茱萸蒼朮厚朴白朮白芷細辛右末用藥一大匙酒一盞調煎三沸候溫入送糞門廣腸中不住摩行以挑糞帶出白膿為驗凡三次差矣○馬後寒用麵麩一升以醋拌濕令白炒熱入帒中搭於腰上隔宿去之紅花散紅花當歸沒藥茴香川楝子巴戟只角麒麟竭木通烏藥藁本右末每二兩鹽一捻ᄆᆡ자冬春溫酒一升夏秋白湯一盞同調空草灌之○馬腰痛久不愈杜冲半兩兔絲子蛇床子各三錢右末鹽一捻漿酒調微熱灌之○馬後胯冷豆豉蓬葱各一兩水五盞煎半和酒灌之○馬遍身黃黃者氣壯血盛而血離經絡藴於膚腠凝結而成瘀血化爲黃水黃者硬而不痛遍身黃者名肺風黃蓋緣心胸壅極熱注三焦料毒聚於腸內始塵迷塞肌膚氣血相凝結而成黃令馬渾身疙瘩미들어들遍體生癬皮膚燥痒口眼風浮此肺熱生風症也宜消黃散黃藥子白

藥子知母梔子大黄黄芩防風黄芪貝母連翹鬱金甘草蟬退右末每二兩蜜二兩朴硝一兩鷄子二箇米泔一盞同調灌之

徹鵲脉血喂青草菉豆拴涼處忌生料○黄腫起時便用鍼遍刺瘇處然後用黄栢雄黄木鱉仁各等分爲細末醋作糊調冷塗於瘡上紙貼之○馮敗血凝蹄遠至卒拴未得庠散血瘀於蹄或久拴久立亦致此症令馮蹄甲焦枯蹄頭堅硬令馮把前把後腰曲頭低卧多过少起走如攢削垂泉穴蹄下雀舌烏金膏塗蹄烙之三修三烙差矣泌土鋪於僦內倲猪脂塗於蹄甲潤之切忌火灰熱地烏金膏紫黄瘀青黄蠟人髮灰四味於銚內溶成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗此膏於蹄火鐵烙之○馮蛆蹄槽下立處掘一尺方埋鷄子許大圓石子令常立石上一二日即差○馮患脾虫咬汗垢相凝亂和爲虫在

於袖袋之中有似蜂雞蝎蛰令馬忽然倒地四足稍空起而復舊水草如常此謂虫咬陰脬之症醫人摘去其虫次翻袖口用貫衆鶴虱花椒臭橘蕪荑蛇床子水二升煎三沸將馬縛倒摘去虫後帶熱洗之○馬喉腫方以物纏刀子露刃鋒一寸許刺咽喉腫處潰之愈又方取乾馬糞置瓶子中頭髮覆之火燒馬糞及髮烟出着馬糞熏之差又方猪脊引脂亂髮燒烟熏如上法○馬結熱起臥不食水草黄連二兩白鮮皮一兩香油五合猪脂四兩以温水四升和藥調停灌下牽行拋糞即愈○凡馬傷熱胡麻葉搗汁灌之立差○馬急黄黑汗取舊靴頸皮水浸汁灌之如不效用大黄當歸各一兩鹽半盞以水三盞煎取半盞分兩服

灌之如再不效鍼破馬尾尖血出即差（見濕汗上）○馬嘍喘毛焦用
大麻子揀淨一升飼之大效（見嘍喘條）○馬諸病搗白鳳仙花連根
葉熬成膏抹馬眼角上即汗出立愈○馬脊梁瘡欲破未破
時將馬脚下尿屎濕稀泥塗上乾即易之如此三五度自然消
散或用猪中鼻泥亦可已破成瘡者用黄丹付之避風立差○
磨打破瘡馬齒莧石灰同搗爲團晒乾後再搗羅爲末先口含
塩漿水洗淨用藥貼之驗○瘡焦痂以麴封之即落○俗方縛
倒馬以利鍼割去惡肉用人尿洗淨塗真麻油又以細米糠糝
塗於瘡上仍以穀草揉細作圈而掩之上用馬衣覆之逐日如
此便差夏月則只以尿洗塗油法不須掩覆之○瘡大難瘉用

粘米粉並田螺肉同搗爛貼瘡上數日待腐去惡肉然後付生
肌藥乾黃獷죡졉비肉燒存性作末和香油塗之瘡便差○馬背
瘡不即治之則瘡口合而內含汁水自然滲下皮中皮盡浮甚
至於通浮脚皮即以大鍼從下逆刺水聚皮膚之處用藥治之
○馬肭為肚帶所傷腫起取礬藁覆一隻浸人尿埋火灰中柔
熱傅之數次便差○鱉甲磨傷不可鍼割一筋絡便作病馬○
馬癧瘡염나흔병初生即塗法油或猪血塗之或以猫皮鞹付於鞍
韉當處腫肉自消○馬瘤病馬足毛際肉腫成頑肉令馬蹇其
病初生時以錫鐵烙之去毛出血炒鹽裹青布置瘤處以燒鐵
灸熨令暫灼十日內可騎○馬鼻內癩病用蕎麥粉灌仍用麥

稈飼○馬疥癩瘡用生牡蠣擣篩或為末付之又胡麻葉擣汁灌之又蕎麥穰燒灰淋洗之○馬疥瘡馬疫凍或沾舊草屋漏水則必至疥瘡先以米泔水淨洗用黃豆炒焦和生麻油擣爛傅之藤蔓根去土洗作末水調塗之雖難治者不過一二度差猛灰二斗白朮擣爛一斗水二盆煎半稍熱塗之二三度永差更無復發好醋和石灰熱搭大妙又方芥子塗之又方蝌蚪올참이알一椀許灌口數萆麻子一升連皮爛擣用麯五合釀酒過四五日待熟先以杻木尖其頭十餘枚束之刷其瘡處後以此酒塗之雖積年難治者無不即效木麥稭小便一宿連皮擣爛作糊塗之即效秋牟米入麯釀酒待熟塗之妙○馬瘟疫(見牛疫條)

○俗方治馬雜病法宜徹蹄血凡馬蹄甲烘熱且燥硬或有自裂處或蹄上生毛之際稍有環蹄腫起之形者是血熱也令馬多蹶行走亦不利即徹蹄血去蹄甲左右各當中血者俗稱燕赤血去蹄頭血俗稱頂血縛倒馬用利刀剜刻蹄甲直至蹄胎已見血色姑留之去對處如前剜刻見血即以鍼尖開出兩蹄二穴之血令一時注下而春宜多而秋冬夏不宜多出凡注血之時血若凝澁必以糝蓋則血自清而易出矣血出適宜便解縛倒立於乾淨板上以索懸馬腰令不得臥切忌污水滲入蹄穴必成膿夏間以綿或南草葉塞剜刻之穴以防蠅子七八日着鐵騎坐用綿時塗香油○刺脛水俗法邑亍匕曽馬足接蹄上骨俗稱珠

子骨骨後聚毛延處俗稱水家(걸믈)誤鍼之患蹇不治自水家直
上數寸許脛骨(종아리뼈)後麁延之前以爪搯之則可知有空陷處
瘀水聚此遂下鍼而必從脛骨邊刺去切勿犯筋誤犯亦蹇不
治矣鍼去瘀水以物封之忌入水調理三四日馬患脛水致蹇
不行鍼用石魚盤劈付之時以人尿注放其工差或搗生桔梗
包付放(鍼後如或急時趕行用黃蠟松脂安鍼孔灸鍼烙塞)◯馬皮浮馬被他馬相踼或
爲物撞觸則瘀血凝而不散令皮離肉矣馬必行走之間忽然
作蹇而即止欲止其傷處則毛必焦竪不擇便以水徧洗其延
處拴於陽中則傷處自然後乾此是皮不貼肉故也即縛倒馬
用鈹鍼亂刺皮工則必出紫瘀血血未盡出以鹽擦其上先以

艾數把浸人尿中待血止取艾安鍼孔上用鐵器燒烙艾上則血自止便以狗皮等物包裹鍼孔令不觸風數日後雖有他處相通作浮高之症旋以冷水洗之則差矣（冬月洗以溫○此是俗稱우다진증或云）以草麻押頻頻塗之則瘀血自散皮更貼而差○馬後脚鄭自腫將馬縛倒燒鐵器繞鄭烙成田字形或日字形以水芹狗糞合搗付於烙字上令腐去惡肉見生新肉恐如前腫大時以尾毛輕輕磨平仍以人尿洗淨凡幾次月餘可差○馬上膘腫（거령존종）以大鍼橫刺旁三膘出血差或割去上膘肉喂以不剉荳箕差然此法損馬不少○馬中暑初眠蠶砂炒黃溫水出汁令飲○馬尋常患熱人尿合眞黃土作泥塗馬槽兩頭內仍灌水令自飲汁又方眞油每灌

馬合牝牡吉日宜三月三日〇飼馬豬食之餘損胎

養馬論〇齕草飲水是馬之本性故中國之馬草水之外所喂者即四五升豆穀而其馬膘肥壯健一日百里而不喂能走蓋養得其法故也我東則不然勿論寒暑草料之外又飼朝夕糜粥其馬體雖易肥而肉不硬實性亦變柔每走三四十里輒汗喘飢倒乏時瘦憊此實養不得其法故也有一武人買一芻馬又喂細剉草冷熟豆乾喂不與水不與粥有時依中國法飲之以冷水則肥健耐飢喂養甚便熱亦少發此實目見之驗也故曰喂馬之法必如中國可也

騾〇驢父馬母生騾騾不生產有孕必死性剛戾不順者切勿畜

之○以健壯體大牝馬待四月令壯大壯驢交之則必產名騾初生數三朔即以紋囊遮日歇行調習不然則項背強直決不可制矣騾生一年餘可試騎坐○治病略與治馬同

驢○養法與騾同治病亦同蛇咬則死

犆○馬父牛母生犆稟性壯健喂養治病與馬同

馬色○栗色騅馬黃公骨青白雜白聰沙夫老赤多沙白雪阿玉鼻者着玉頂小台星花肚膊月羅黑鬃尾黃高羅白臉者佛粉嘴巨駱銀鬃尾淡赤表馬黑鬃尾淡白加溫里黑加羅劉鬃者駱環眼者吉四明四足白並鼻白五明二足三足倣此白松羅古玉鼻尖鼻末白青聰馬

相良馬法辨駑馬形狀相旋毛吉凶歌相馬齒法圖像四本別

無可詳故並除之

養猪○作猪圈吉日甲子戊辰壬申甲戌庚辰戊子辛卯辛巳甲午乙未庚子壬寅癸卯甲辰乙巳戊申壬子○圈門宜高二尺濶一尺五寸放水惟寅申二位吉又宜乙方○修圈吉日申子辰日忌正四廢飛廉刀砧天地賊受死日○買猪吉日甲子乙丑癸未乙未甲辰壬子癸丑丙辰壬戌忌破羣日庚寅庚申壬辰戊辰甲寅己卯○出猪出日亥不出猪又忌破羣日

母猪相法○母猪取短喙無柔毛者良喙長則牙多一廂三牙以上者難肥不須畜小時喂糟不長兆者子母不同圈同圈則喜相聚不食壯者同圈則無害圈不厭小圈小止容一猪使不得閙轉則易長處不

厰檝冬月小厰盖之多其草藉以避風雪
閹猪方○猪児三日掐尾六十日後犍犍而不掐則前大後小○
閹猪了待瘡口乾平後復取巴豆兩粒去殼爛搗和麻籸(깻묵)糟
糠之類飼之半日後當大瀉其後日見肥大
猪児蒸籠法○至臘月生者豚一宿蒸之不蒸則腦凍不出旬便
豚性腦小盛寒不能自煖索籠盛豚著甑中微火蒸之汗出便罷
喂猪法○春夏草生隨時放牧糟糠之屬當日別與八九十月放
而不飼所有糟糠則蓄待窮冬春初初産者宜煮穀飼之凡猪
性甚便水生之草食之皆肥○令猪立肥法貫衆(三兩)蒼术(四兩)黄
豆斗一芝麻升一各炒熟共爲末喂之十二日則肥大矣麻子二升

搗十二杵盐一升同煮和糠三升飼之立肥○飼猪別法冬瓜一顆和桐葉飼猪一冬不與諸物喫自然不饑長三四倍桐梓二樹花葉飼猪並能肥大且易養

猪不吃食○牙皂焙乾一錢研末麝香五里共研末吹入鼻内立效○猪雜病割去尾尖血出即愈

猪瘴疫以蘿蔔或葉與之此物猪所好食性凉能愈其熱毒又能宣轉其腸胃使之流通若不食則難救○一法灌以梔湯或灌米泔水及盐水或啗以水草菉豆即愈

胡商船中養猪法○以廣板鑿四穴以猪四脚柙其穴中使不得轉動置在空中日三時飼粥食等物猪之屎尿任其自放如是

月餘肥大勝矣

養羊○羊圈必須與人相近開窻向圈探比墻爲廠圈中作臺開竇無令停水二日一除勿使糞穢

羊種○臘月正月生者爲上至月二月生者次之若母羊十羝則羝羊二羝無角者更佳少則不孕多則亂群羊火畜也其性惡濕利居高燥

作羊棧吉日戊寅己卯辛巳甲申庚寅甲午乙未庚子甲辰○納羊吉日癸未匃日七月戊己日九月巳日

羊初生飼法○細切乾草少着糟水拌經五七日後漸加磨破黑豆調糟水拌之每宜少飼不可多與多則不食可惜草料兼又

不肥慎勿與水喫水則退膘肥也溺多可一日六七次上草不可

太飽飽則有傷

放收法○春夏宜早放早收若晚收過午未時熱必汗出有塵土入毛內即生疥瘡秋冬晚放若放早喫露水草口內生瘡鼻亦成膿巳時放午未時還入○羊性好鹽常以鹽啗之為妙或以尾器盛一升懸欄中羊自數還之不勞人收○三四月中種大豆一頃雜穀並草留之不須鋤治八九月中刈作青茭若不種豆穀者草實成時收刈雜草薄鋪使乾勿令鬱浥既至冬寒多饒風霜或春初雨落青草未生時則須飼不宜出放

中水○先以水洗眼及鼻中膿汚令淨次用鹽一大撮就將沸湯

研和候冷澄清取汁注少許於兩鼻內五日立愈

羊疥○諸羊便宜間別之免致相染不爾則合羣致死疥先着口者難治多死凡羊經疥得差後夏初肥時宜賣易之不爾後年春疥發必死矣○治方藜蘆(박새)根不拘多少搥碎米泔浸瓶盛塞口置熱竈邊數日後未時先以瓦瓦刮瘡處令赤用湯洗之去瘡甲拭乾以藥汁塗之再次即愈疥若多漸漸塗之○百草霜(鍋底墨)及蓋桐油等分調勻塗之着多少隨宜用之

羊夾蹄○羖羊脂煎熟去滓以瓦鐵燒熱將脂勻鐵上烙之放入水次日即愈

養鷄○治鷄鵝鴨栖吉方子午卯酉方名四極甲丙庚壬方爲中

皇此八方治之主物大旺○作鷄鵝鴨栖吉日乙丑戊辰癸酉辛巳壬午癸未庚寅辛卯壬辰乙未丁酉庚子辛丑甲辰乙巳壬子丙辰丁巳戊午壬戌宜滿成開日忌刀砧大小耗四廢○買鷄鵝鴨吉日甲子乙丑壬申甲戌壬午癸未甲午丁未甲辰乙巳忌破羣日○出鷄忌酉日又臘月殺氣不祥又忌酉日殺鷄○抱鷄鵝鴨雛吉日宜天月德生氣福生益後黃道日忌月殺月厭月破血忌血支死氣受死休廢四廢天地賊大小耗天瘟空亡閉日臘月忌殺鷄一云忌臘日卯十二月初八日

取鷄種法○桑落時一云霜降時生者良春夏生者不佳形小毛茂脚細短善字窠育雛

作鷄栖法○古方門上置鷄栖令人家吉又云以李樹作架坐鷄則盛然鷄栖必擣地為籠籠内着栈雖鳴聲不朗而安穩易肥又免狐狸之患○凡鷄籠小而鷄兒多則氣熏令鷄目盲矣籠内積屎必時時除去免致蒸成鷄病鷄栖要冬暖夏涼

相鷄法○白雄鷄辟邪然養三年則反為鬼使即去之○鷄黑身白頭者烏鷄白足者病六指者食之殺人鷄有皮膚半白半黑自喙至足黑白名曰陰陽雞患瘡者懷中抱之立止吹毛辞者○赤胸白烏鷄治風凡烏鷄眼不黑非真烏鷄○變鷄毛色法用鷄栗子二兩硫黄二錢共為末以米湯拌藥與鷄食之食盡其鷄如拳其毛五色可愛○鷄健闘則不失其雌於他雄矣霜降時生性惡必善闘雄黃末攪飯飼之可

去其胃虫此藥性熱又可使其力健又方草烏頭末塗鷄冠上建鬪建鸁雞方奮鬪時收按其胸則氣塞便死○老甚鷄勿食

鷄初到家令不走法○以淨溫水洗其脚足自然不遠走暑月龍來雞方其熱喘時飲以冷水便死

肥鷄法○以油和麵捏成指尖大塊日與數十枚食之或以硬飯同土硫黄研細每次用錢半許同飯拌勻喂之數日即肥○喂小麥飯則易大○用棧鵝法則易肥法見下○鷄雌雄皆斬去六翮無令得飛出外蒸小麥飼之三七日便肥大拔尾則體便肥

令鷄下卵不肯抱法○母鷄下卵時逐日食內尖以麻子喂之則永不抱只下卵矣

護鷄雛法○新下雛以爪甲摘去嘴頭甲飼以碎米或細米之類月餘無令出窠恐烏鳶取去○初生時飼以燥飯無甚妨若飼濕飯則臍膿而死若燒柳柴則小者死大者目盲 抱雞窠下懸斧子皆成雄雞

養鷄法○設一大園四圍築墻高丈許棘遮其頭中築一行墻分為兩園園內各作一屋房廣丈五屋下懸筐 一云墻內四方各置四大鷄栖 令鷄宿抱二月間先於左園內耕地令熟做秫黍粘粥洒之覆以草二日盡化為虫便以雌鷄二十隻大雄鷄五隻 一曰十雌一雄 養於其中如左園虫盡即驅之右依上再用粥洒之如此則鷄自肥 俗方多積穀糠於園內洒水令濕則虫自生可作鷄食 園傍種蜀黍畝許以取蔽蔭至秋收子又可飼鷄尤為肥長

穀産法○取雌鷄去雄作栖窠多與穀令肥充則一鷄生百餘卵

不雛食之亦無咎 雞卵一箇成兩雛者

鷄雜病○眞麻油灌之立愈○鷄中蜈蚣毒研茱萸飼之○鷄哮白菜배최葉包鼠糞蘸香油搵之○鷄疫一鷄染疫餘鷄皆死即須以藍盛鷄又口懸掛或移於閣上則免、猪肉切碎喂之愈又以雄黃爲末飯喂之愈○生漆和眞末爲丸大鷄則七八丸或十丸小鷄則令呑二三丸即效

養鵝鴨○諸吉日與鷄同考

擇種○亦取桑落時生者爲良形小毛茂脚細短者善守窠育雛○鵝鴨母其頭欲小口上龂有小珠滿五者生卵多滿三者爲次

○鵝鴨宜以一歲再伏者為種且貪伏不起者可為種其數起者不任為種大率鵝三雌一雄鴨五雌一雄

鵝鴨抱法○大鵝十子大鴨二十子小者減之其貪伏不起者須五六日一與食起之令洗浴鵝鴨皆一月雛出量雛欲出時四五日之內不可聞鼓聲砧舂礱磨及車轍犬吠猪犬等聲又不可用淋灰器作抱窠勿令新產婦觀看須五六日凡鵝鴨六年以上老不復生伏宜去之少者初生伏又未能工惟數年中佳耳

護雛法○雛既罷出之先以粳米為粥糜一頓飽食名曰填嗉不爾病噎死然後以粟飯切苦菜蕪菁英為食以清水與之濁則易不易泥塞臭則死入水中不用停久尋即驅出此既水禽不

得水即死臍未合久在水中冷徹亦死籠内高乾處敷細草令
寢處其上亦以臍未合不欲冷也
棧鵝易肥法○以稻子或小米大麥不計煮熟先用磚蓋先小屋
放鴨在内勿令轉側門以木棒簽定只令出頭喫食日喂三四
次夜多與食勿令往口撏去尾際毿毛如此三日加肥一斤○
鵝鴨以土硫黃和飯飼之易肥○鵝惟食五穀生菜而不食生
虫鴨靡不食矣
收卵法○雌鴨無雄者多喂豆粟麥常令肥飽則一鴨便生百卵
可食不可指○雌鴨每年五月五日不得放棲只乾喂不與水則日
日生卵不然或生或不生○以白木作卵形置鵝窠誘之生時

孵卽收取別置煖處以柔草覆之

鴨卵令鷄抱法○鴨卵令鷄抱之鷄雛既出替他鷄抱之恰滿其期始出鴨雛矣一云善抱雞則雞一鷄亦能出鴨雛矣

鵝能退蛇蠻盜而虎聞其聲便來食之故夜必收宿牢圈之內

養狗○納宜辛巳壬午乙酉壬辰甲午乙未丙午丙辰戊午又宜龍虎日戌日勿出勿殺忌戌日吃犬

相狗法○黃狗尾白或耳白或四足白或前兩足白或純黃色或胸白者吉一云足白細○白狗尾黃或前足俱黑或頭黃或虎文者吉○黑狗面白或前足俱白或兩耳白純黑色者能辟伏尸有青斑者識盜則吠或後二足白頸黃者或足黃或尾白或一足

白者吉○赤狗頭黑或純赤者吉○青犬黃耳者吉○黃狗三足白或口黑或足俱白者凶○白狗尾黑或黃耳或心下黑者凶純白能為怪勿畜一云養三年內辟邪三年外為鬼使去之背白者凶○黑狗尾足黃或四足白者凶○凡狗項白掘地者去之○凡狗生三子俱黃四子俱白五子六子俱青八子俱黃者皆吉狗生一子是其家將興之徵慎勿與人畜之青色短尾綵毛狗狀若獅子者俗云能辟邪○狗雖畜物有愛主之誠故家養者不可殺之然畜至四五歲之老則多有作怪者須即去之○狗咬人毒發則雖久後必死故狗惡多咬者及春間發狂咬嚙之狗急急去之尾垂舌黑者是狂犬也

相獵狗法○頷下有逆生鬚一根三根者是為良獵狗或生二根或四五根者是為凡狗

養狗法○兒狗多喂過飽則必生脚腫膮彎之病須以糠粥之屬細細與之令習喫小兒屎牛馬廐前或庫舍左右各置卧宿之窠切勿令上軒房之內或放衆家內或甜食器皿之間各别打禁則自然訓習成性矣○家或近山則虎皆噉食必於軒下排押真木釘子牢設板門向夕驅狗納因於其中或立柴圈以防虎患可也

狗諸病○用水調平胃散灌之加巴豆七粒方蒼朮二錢厚朴陳皮甘草各一錢○狗猝死以葵根塞鼻可活○狗遍身膿癩百部根

濃煎洗之○児狗疥虫赤小豆煮取汁洗之○狗疥用草麻子三四箇細切和飯飼四五日又方巴豆二箇如前法飼一次○蠅虫咬傷麻油塗之或以南草莖作圜子套狗項上或以荏子油塗毛亦辟虫

救打死方○狗被打死而體尚完者置於地上以好黄土圍之覆之以篙空石則半日能活

狗瘦甚○活鱔納竹筒灌口即肥

小狗吠不絶聲○香油半匙灌鼻中經宿不吠

裹狗足善走○生胡麻油塗狗足裹之以帛能日行萬里

養猫○宜納甲子乙丑丙午丙辰壬午庚午庚子壬子又宜天德月德生氣日○忌飛廉日

相猫法〇身短尾長面短眼如金銀聲雄者良可畜若露爪者喜
翻屋尾腰長善走面長嘴鷄尾大性懶不可畜

納猫法〇取猫古方用手桶等物而俗方以布帒盛來勿令人見
可也〇欲出猫亦盛布帒過河棄之不然雖遠必復來〇猫性
至毒不可妄殺亦不可痛打人有往往遭其害者戒之戒之〇
猫只生一子妨主生純雄純雌者亦不吉

猫雜病〇烏藥水磨灌之〇猫癩以栢油擦之三次除根〇猫喜
煨睡因火邊瘦瘁用猪腸或魚腸入硫黃煨熟喂之

救小猫被人踏死〇蘇木濃煎水灌之

猫胎死腹中〇朴硝煎湯灌之即出人與牛馬亦然真奇方也

養魚○五牸之法一曰養魚二曰養羊三曰養豬四曰養雞五曰養鵝鴨經曰治生之術有五水畜第一魚池是也

放生法○築塘須擇良年月日時下魚種亦在生門放如庚申壬子即坤方下種訣曰庚申壬子在坤方壬戌庚子是离鄉甲寅丙辰巽宮位癸卯辛未艮中藏乙酉辛丑還坎位己未丁亥兌上當只論生門下種子取法依排死路亡

養魚法○以六畝地爲池池中作九洲可掘丈許深以磚石疊塚屹嶇作十洲勿出水面○凡魚池不宜太深深則水寒而魚難長矣求懷子鯉魚長三尺者二十頭牡鯉長三尺者四頭以二月上庚日納池中一云正月上旬納池令水無聲魚必生至四月納一神守神守即鱉也六月納二神守八月納三神守

盖魚滿二萬三百六十則蛟龍爲之將而魚將飛去有鱉則魚不飛去魚在池中周旋九洲無窮自謂游江湖也凡魚日行千里則肥不然瘦至来年二月得鯉長一尺者一萬五千枚二尺者萬枚三尺者五千枚至明年得長一尺者十萬枚二尺者五萬枚三尺者五萬枚四尺者四萬枚留長二尺者二千枚作種所餘皆賣至明年不可勝計所以養鯉者不相食易長又貴也此范蠡法○凡有魚之所須擇泥土肥沃蘋藻繁盛爲上然必有居人築舍守之仍多方設法以防獺害凡所居近湖之所依此法畜之可致速富此必然之效也今人但上江撈取魚種塘内畜之飼以青草歲可及尺亦可供用○池址後宜特深魚必聚焉

則三面有日易長飼草亦於後處一日兩番魚小時草必細飼至冬則止○一法作羊圈於塘岸上每早掃其糞于塘中以飼魚如是則可不必人打草但魚略有微滯矣○池水流去處柳以簾子以防失魚而簾密則水不流疎則小魚涌去須用大板鑿小孔以代簾子最

魚忌○橄欖渣肥皂水莽草黄栢實椒皮水各色油皆令魚死又池中不可漚麻及着鹹水石灰皆令魚泛食鴿糞楊花及食鳥糞過皆泛以圊糞解之○魚食鵝鴨卵黄則中寒而不子○木瓜燒灰撒池中毒魚○巴豆川椒殺魚

衛魚法○池傍種芭蕉則露滴而解魚泛又樹葡萄架免乏池岸

邊種芙蓉可辟水獺大忌䱜魚同入能食魚故也○魚遺毒翻
白急踈去毒水別引新水入池多取芭蕉擣碎置新水來處使
魚吸之則觧或以溺或以糞精澆池面觧
生魚法○取魚子將鷄蛋卵也去黃白以子入內用鷄抱廿一日取
出陰乾放水中卽成魚
養金魚法○土池最佳可置於草堂後窗之下土氣自與水相合
其萍藻荇帶之類自能茂盛而魚得其水土自然之性游漾浮
玩於萍藻之間甚可觀玩池中置一二箇上水石山可種石菖
蒲於石根種錢蒲於石上又以松竹梅蘭之類多種於上儼然
是一蓬島餵飼當用無油盐蒸餅擊窗欞而投之久之聞其聲

熟如有客至扣之其魚自出可賞須過清明日以前忌喂

醫魚法○魚瘦生白點名魚虱用楓樹皮或白楊皮投水中即愈

或新磚入糞桶浸一日晒乾投水亦好

作小池法○庭畔無水根處量大小掘地四面築石墻下則築堅

以石後以瓦土極泥塗乾積柴燒熟則水不能漏雖不燒若極

厚堅築如磚又置大甕貯水作細穴以竹引流則不涸欲種蓮

別用他泥中可養魚

作盆池法○別造大盆四尖掘地方正便安盆其中盆口要與地

方平以土填平空繞盆口鋪莎草盆內納略干肥土貯水滿盆

水面投泛萍葉種蓮蘆蒲之屬養魚其中則遠見之髣髴真池

石假山○水濶石則既難得若軟石則可以琢造怪石就池邊疊積為山使巖壑幽深多種楓松烏竹及杜鵑躑躅石竹百合射干之屬池工又種唐菱花山後置大甕貯水用竹吸引自山頂縈回延池作瀑布而其水道以尾土堅塗則不漏矣朝夕相對自多奇趣

養蜂○收蜂割蜜吉日天月德合月財五福母倉日○忌天賊天瘟受死大耗小耗月厭月殺月破天火九空四方耗又忌建滿平收破閉又忌蜂王殺日春忌甲寅庚申夏忌辰戌秋忌戊辰冬忌丙戌○宜除危定執成開日

接蜂法○三月間蜜蜂移向他所成團飛過若低飛者是欲向遠

高飛者是欲向延也急用細沙土洒擊蜂團則當留掛簷籬樹木之間令人頭着艾圈持艾篙又持大瓠瓠內塗若干蜜須在於蜂團之側以艾篙緩緩掃入於瓠內慎勿驚動待蜂入瓠畢以布巾之類蒙下之一云用男子裙襦而收貯下之

安窶法〇穴居曰窶古謂桶用大木心朽者或用四尺木作櫃形或卷簟作桶形外以黃泥塗之而終不如朽心木桶矣擇向陽燥潔高敞前無碍阻之地安蜂窶窶上結草作笠形覆之亦塗黃泥令不透風桶下距上三寸許開一小竅只容一蜂出入若竅大而蜂王逃出則舉蜂皆失桶內以米粥塗之以為初糧蜜蜂滋衍一年增至二三窶窶前常置水一器不致渴損蜂團初入桶時

則必桶內塗蜜引之○養蜂年久則將蜂漸多畢竟逃去且蜂不盛必折
去將蜂割蜜後下見則蜂家之間有蜂作團房以手指塗蜜推
而見之則其中大者將蜂捉出去之蜂家如無則舉筒見而去
之○筒中有虫則畢竟蜜蜂盡損死虫色白小時時下落必於
此時上蓋傍邊割穴以他筒倚加元筒下作坑蒸鷄略有薰氣
者安于坑中盡于元筒中則其虫盡落然後以烟氣下于元筒
俄而加筒去之○以松木作穴上下相通朽心者尤好前後左
右以半月形為穴冬則塞之夏則開之以石撑之或慮蜂家撓
落也○作蓋以瓠子열박甚好如無以禾藁結為之而長高內廣
闊為之蓋為取蜜多也

割蜜法〔 〕六月開蜜爲良若韭花後則蜜惡而不耐久凡蜜有數十等春爲百花蜜色渾而味酸又作腥氣冬爲稻花蜜色如凝脂味亦易酸皆不堪用須擇純夏蜜乃佳〔 〕待天氣微寒百花已盡宜開蜂窶後門用艾燒烟微熏蜂皆飛向前去用薄荷葉嚼細塗在手面上蜂自不螫或用紗帛蒙頭及身或用皮五爪手套甚妙約量存留冬春間蜂食之資餘者揀大蜂脾以利刀割下脚封其口將蜜脾用新生布濾淨不見火者爲白沙蜜見火者爲紫蜜却將濾滓入鍋内慢火熬煎候融化掬扭出滓入熬冷水内凝定自成黃蠟〇上盖内有蜂者以指爪彈之則可知以弓弦或葛繩爲之 트기되몬쥐할ㄴ두에둥ㅅ 이에약간섈을며트기면 蜂死盡下

如不下以箇竹𥫗于草盖之中以南草烟氣吸下則蜂必盡下然後以刀盡割草盖取蜜草盖下十字上盡為取蜜

救蜂飢法○冬月割蜜過多則蜂飢死飢時可將鷄一二隻退毛去腸肚懸掛窶內其蜂自然食盡春來開門只存鷄骨而已○俗法以蕎麥麵作餛飩咕吁置窶內令蜂食之

蜂戒○曾見峽氓養蜂取蜜必全桶屠殺好得其利慘毒甚矣諺云養蜂專業者必無子豈不大損陰德之報耶戒之戒之

護蜂法○用大方石作桶臺鋤淨臺邊雜草夏月則用小石子撐桶寸許以通風凉冬月則去其撐石以黃泥密封桶臺之隙以防風寒如有蟻子附入桶內用猛灰繞桶底又以索維桶四面

免致風倒落損蜂脾

取蜜俗法○六七月間待糖𥻗花始開之時脫去桶盖以陶器或瓠瓢其口倒盖於桶上口令兩口相與吻合若其口大小不同則便不用矣以泥蜜封吻合之隙如風透隙則蜜不能成以草冠冪桶上畧過十日後以爪甲作扣盖器之外其聲濁者是蜜成矣其聲清空者蜜未及成矣聲果濁則剔去封隙之泥用細麻繩繞器桶之隙絞而截之取下器見之則千門萬户一一含蜜真為可玩即以匙子劃出蜂脾置於濕處則蜜自流下此是上品白清也其脾即好白蠟也又如前覆器則一秋可劃三次蜜矣○將取蜜之時先以物輕扣覆器之外良久取器則蜂下

入桶內不敢出聲人矣

養鶴〇但要聲清唳者為上喙短頸長而瘦脚高者可觀〇雌雄相隨如步斗狀履跡而孕又曰雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕歲生數卵雌守卵雄往來衛見之雌起則喙之見人窺其卵則喙破而棄之常以夜半鳴雛鶴三年頂紅七年翮具十年十二時鳴三十年鳴中律古云鶴不發頂不能出其聲

鶴病〇飼蛇鼠及煮大麥〇鶴食全鰒死

教鶴舞法〇俟其餒置食於闊遠處拊掌誘之或鼓琴或吹笛亦可則奮翼而鳴若舞狀久則聞拊掌聲必起此食化也一云房埃令極熱置圓瓠子埃上驅鶴入房中則鶴避埃熱欲坐瓠上瓠子圓轉鶴不能足立自然張翼似飛不飛如此之時便鼓琴中其節使之暗解舞狀

養鷹〇取鷹雛於巢上取後須掛人草鞋一隻於巢上母鷹知人取去明年必復養雛不然便移去〇鷹産初年稱甫羅陳一年架上者稱手陳眼赤而毛白亦有山陳者伏於架上而頻鳴者是鵰鷹

相鷹〇嘴欲短而曲鼻孔欲大而多毛此名貪毛佳眼欲垂若外皆如裂則性喜颺腦項欲平如突凸者喜颺肩欲聳而翩翮欲垂下胸欲仰背上毛欲一一掀起而不穩貼翮翅一一廣則雖遠飛而不能疾若一一狹則雖飛疾而不能致遠頸欲縮短眼要圓脛欲瘦足欲瘦如乾薑筌足掌下皮欲澁硬而不軟滑爪欲直如鷄爪若爪曲則搏擊不捷尾欲似蘆葉而整時要摺疊如扇俗稱尾垂架下要不過一握若太長則喜颺坐足要狀如

十字盖小體者頭欲大柱脚即也欲高尾欲短大體者頭欲小柱欲短尾稍長無妨矣鷹毛欲稀踈坐如立釘言其仰也凡鷹以體大為上然才品則多在於體小者且尾骨異於凡鷹者必有奇才如一眼黑一眼黄之類也白鷹多夭難養矣凡鷹逐雉必高出雉上或捷徑迎擊或故入雉下翻身仰搏隨於空中者皆良品也或有見雉而直上雲際俯瞰雉落之處疾下搏擊者尤良

馴鷹法○山客設機捕鷹相其良者而馴養之日夜替人臂之夜必達曉明燈使不得暫睡至二十餘日欲回頭藏嘴而睡是為馴熟也始以小環繫絛用長繩貫之遠以肉呼之如此累日見

其無疑然後方可調肌議獵凡鷹方馴之時必善飼得肥方好
風大日則必飃失勿獵可也

調肌法○凡鷹飢附人飽輒飃去故飢飽必取胸上肌而消息之
肌肉堅實者肉多脂而飽者也肌肉虛軟者飢而少脂也肌若
太虛軟則令鷹氣弱不可獵矣見其胸肉堅實取鷄肉劉作片
浸冷水連日量宜飼之待其肌不堅不軟始可出獵而先一日
用綿子團如大豆大裹水浸肉飼之則俗稱加伊音鷹食此半
日餘肉消復只吐綿團子是拭出腸脂之法也鷹肉既淨肥又
調平方許獵雉而新試之時切勿多放須一次乃還

治鷹病○鷹方盛氣竭力獵得一雉而人恐鷹飽妨於再獵終

不與食則鷹不能克其欲而病便生矣故得雉必取頭腦髓或熱肝以飼之鷹病則放黑白相混之屎又看尾肉端過夫骨間狹者無病闊者有病○氣竭生病人參和肉飼之○鷹食鷄必死

陳鷹法○春獵罷後使坐架飼養而一鷄可飼三日三十鷄可以陳過諸般禽肉及鼠犬等肉皆可飼之而惟牛肉昏眼忌飼蛇肉善退羽然其毒能損鷹爪云

養鹿獐○取新生者作柴圈畜之而飼以軟香草菉豆之類多飢則易附人且常令近人可也

養鳧鸂鶒비오리鵞鴨鶴鷄等取卵使鷄抱之臨啄抱時頻頻候視

趂其鬣毛未燥以唾塗乾則永不颺去